

ミニトマト防除指針

ミニトマト防除指針

西条中央地域農業普及センター

	品名	成分	希釈倍数	使用時期	疫	葉	灰	ア	ハ	ハ	オ	マ	オ	タ	ス	効果
					病	病	病	ブラムシ	ダニ	スモンヨトウ	オタバコガ	マメハモグリバエ	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ	スリップス	
殺菌剤	ドイツボルドーA	塩基性塩化銅	500倍	-/-	○	○										予防
	ランマンフロアブル(経過)	シアゾファミド	2000倍	前日/4回	○											予防
	トリフミン乳剤(経過)	トリフミゾール	2000倍	前日/5回		◎										治療
	フルビカフロアブル(経過)	メパニピリム	2000倍	前日/4回			◎									予防
	ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ・テオファネートメチル	1000~1500倍	14日/6回		○	○									治療
	セイビアーフロアブル20	フルジオキシニル	1000~1500倍	3日/3回			◎									治療
	ロブラル水和剤(経過)	イプロジオン	1500倍	前日/3回			◎									予防
殺虫剤	トルネードフロアブル(経過)	インドキサカルブMP	2000倍	前日/2回						◎	◎					食毒(幼虫)
	アフーム乳剤	イクメクチン安息香酸塩	2000倍	前日/2回							◎	○			(◎)	食毒・接触毒(幼虫)
	コテツフロアブル	クロルフェナピル	2000倍	前日/2回					◎		◎				(◎)	食毒・接触毒(幼虫)
	アドマイヤー顆粒水和剤	イミダクロプリト	1000倍	前日/2回				◎							◎	接触毒(成虫・幼虫)
	モスピラン水溶剤	アセタミプリト	2000倍	前日/2回									○		○	接触毒(成虫・幼虫)
	トレボン乳剤(経過)	イトフェンプロックス	1000倍	前日/2回									○	○		接触毒(成虫・幼虫)
	カスケード乳剤	フルフェノクスロン	2000倍	前日/4回								◎	◎		(◎)	食毒(幼虫の脱皮阻害)

注) 農薬希釈順位: 展着剤→液剤→水溶剤→乳剤→フロアブル剤→水和剤
 展着剤: アプローチB1(1000倍 浸透性と残効性を向上)

◎: 卓効

○: 効果あり

(◎): 適用外であるが効果あり
 (平成16年4月作成)

